INTEGRATION

by substitution

Question 1

Carry out the following integrations **by substitution** only.

1. $\int 4x(2x-1)^4\,dx = \frac{1}{6}(2x-1)^6 + \frac{1}{5}(2x-1)^5 + C$

2. $\int \frac{2x}{2x+1}\,dx = \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{1}{2}\ln|2x+1| + C$

3. $\int x(4-x^2)^{-\frac{1}{2}}\,dx = -(4-x^2)^{\frac{1}{2}} + C$

4. $\int \frac{4x}{6x^2-1}\,dx = \frac{1}{3}\ln|6x^2-1| + C$

5. $\int x(3x-1)^4\,dx = \frac{1}{54}(3x-1)^6 + \frac{1}{45}(3x-1)^5 + C$

6. $\int \frac{8x}{\sqrt{4x-1}}\,dx = \frac{1}{3}(4x-1)^{\frac{3}{2}} + (4x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

7. $\int \frac{2x^2}{\sqrt{2x^3+1}}\,dx = \frac{2}{3}(2x^3+1)^{\frac{1}{2}} + C$

8. $\int \frac{4-3x}{x+2}\,dx = 10\ln|x+2| - 3(x+2) + C$

9. $\int \frac{4x^2}{2x-1}\,dx = \frac{1}{4}(2x-1)^2 + (2x-1) + \frac{1}{2}\ln|2x-1| + C$

10. $\int \frac{4x-3}{3x-4}\,dx = \frac{4}{9}(3x-4) + \frac{7}{9}\ln|3x-4| + C$

1. $\int 4x(2x-1)^4\,dx = \int (4x)\,u^4 \frac{du}{2} = \int 2xu^4\,du$

$= \int (u+1)u^4\,du = \int u^5 + u^4\,du$

$= \frac{1}{6}u^6 + \frac{1}{5}u^5 = \frac{1}{6}(2x-1)^6 + \frac{1}{5}(2x-1)^5 + C$

$u = 2x-1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u+1$

2. $\int \frac{2x}{2x+1}\,dx = \int \frac{2x}{u} \times \frac{du}{2} = \int \frac{u-1}{u} \times \frac{du}{2}$

$= \frac{1}{2}\int 1 - \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{2}\left[u - \ln|u|\right] + C$

$= \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{1}{2}\ln|2x+1| + C$

$u = 2x+1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u-1$

3. $\int x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}\,dx = \int \cancel{x}\,u^{\frac{1}{2}} \times \frac{du}{-2\cancel{x}} = \int -\frac{1}{2}u^{\frac{1}{2}}\,du$

$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} = -u^{\frac{3}{2}} + C = -(4-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

$u = 4-x^2$, $\frac{du}{dx} = -2x$, $dx = \frac{du}{-2x}$

4. $\int \frac{4x}{6x^2-1}\,dx = \int \frac{4\cancel{x}}{u} \frac{du}{12\cancel{x}} = \int \frac{1}{3u}\,du$

$= \frac{1}{3}\ln|u| + C = \frac{1}{3}\ln|6x^2-1|$

$u = 6x^2-1$, $\frac{du}{dx} = 12x$, $dx = \frac{du}{12x}$

5. $\int x(3x-1)^4\,dx = \int xu^4 \frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int xu^4\,du$

$= \frac{1}{3}\int \frac{u+1}{3}u^4\,du = \frac{1}{9}\int (u+1)u^4\,du = \frac{1}{9}\int u^5 + u^4\,du$

$= \frac{1}{9}\left[\frac{1}{6}u^6 + \frac{1}{5}u^5\right] = \frac{1}{54}(3x-1)^6 + \frac{1}{45}(3x-1)^5 + C$

$u = 3x-1$, $\frac{du}{dx} = 3$, $dx = \frac{du}{3}$, $3x = u+1$, $x = \frac{u+1}{3}$

6. $\int \frac{8x}{\sqrt{4x-1}}\,dx = \int \frac{8x}{u^{\frac{1}{2}}} \times \frac{du}{4} = \int \frac{2u+2}{u^{\frac{1}{2}}} \times \frac{du}{4}$

$= \int \frac{2(u+1)}{2u^{1/2}}\,du = \frac{1}{2}\int \frac{u}{u^{1/2}} + \frac{1}{u^{1/2}}\,du = \frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}} + u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + 2u^{\frac{1}{2}}\right] = \frac{1}{3}(4x-1)^{\frac{3}{2}} + (4x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 4x-1$, $\frac{du}{dx} = 4$, $dx = \frac{du}{4}$, $4x = u+1$, $8x = 2u+2$

7. $\int \frac{2x^5}{\sqrt{2x^2+1}}\,dx = \int \frac{2x^5}{u^{\frac{1}{2}}} \times \frac{du}{4x^3} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$= \frac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{2}\left[2u^{\frac{1}{2}}\right] = \frac{2}{3}(2x^2+1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 2x^2+1$, $\frac{du}{dx} = 4x^3$, $dx = \frac{du}{4x^3}$

8. $\int \frac{4-3x}{x+2}\,dx = \int \frac{4-3x}{u}\,du = \int \frac{4-(3u-6)}{u}\,du$

$= \int \frac{10-3u}{u}\,du = \int \frac{10}{u} - 3\,du = 10\ln|u| - 3u + C$

$= 10\ln|x+2| - 3(x+2) + C$

$u = x+2$, $\frac{du}{dx} = 1$, $du = dx$, $x = u-2$, $3x = 3u-6$

9. $\int \frac{4x^2}{2x-1}\,dx = \int \frac{4x^2}{u} \cdot \frac{du}{2x} = \int \frac{2x^2}{u}\,du = \int \frac{4u^2}{2u}\,du$

$= \int \frac{u^2+2u+1}{2u}\,du = \int \frac{u^2}{2u} + \frac{2u}{2u} + \frac{1}{2u}\,du = \int \frac{1}{2}u + 1 + \frac{1}{2u}\,du$

$= \frac{1}{4}u^2 + u + \frac{1}{2}\ln|u| = \frac{1}{4}(2x-1)^2 + (2x-1) + \frac{1}{2}\ln|2x-1| + C$

$u = 2x-1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $du = \frac{du}{2}$, $2x = u+1$, $4x^2 = (u+1)^2$, $4x^2 = u^2+2u+1$

10. $\int \frac{4x-3}{3x-4}\,dx = \int \frac{4u+4-3}{u} \times \frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int \frac{4u+4}{u} - \frac{3}{u}\,du$ (BREAKING THE FRACTION)

$= \frac{1}{3}\int \frac{4u+4-7}{u}\,du = \frac{1}{3}\int \frac{4u+7}{u}\,du$

$= \frac{1}{3}\int 4 + \frac{7}{u}\,du = \frac{1}{3}\left[4u + 7\ln|u|\right] + C$

$= \frac{4}{3}u + \frac{7}{3}\ln|u| = \frac{4}{3}(3x-4) + \frac{7}{3}\ln|3x-4| + C$

$u = 3x-4$, $3x = u+4$, $\frac{du}{dx} = 3$, $dx = \frac{du}{3}$, $x = \frac{u+4}{3}$, $4x = \frac{4u+16}{3}$, $4x-3 = \frac{4u+16}{3} - 3$

Question 2

Carry out the following integrations **by substitution** only.

1. $\int 6x(3x-1)^3\,dx = \frac{2}{15}(3x-1)^5 + \frac{1}{6}(3x-1)^4 + C$

2. $\int \frac{5x}{5x-1}\,dx = \frac{1}{5}(5x-1) + \frac{1}{5}\ln|5x-1| + C$

3. $\int 3x\left(x^2+1\right)^{\frac{1}{2}}\,dx = \left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}} + C$

4. $\int \frac{3x^2}{2x^3+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left|2x^3+1\right| + C$

5. $\int x(2x-1)^5\,dx = \frac{1}{24}(2x-1)^6 + \frac{1}{28}(2x-1)^7 + C$

6. $\int \frac{10x}{\sqrt{1-2x}}\,dx = \frac{5}{3}(1-2x)^{\frac{3}{2}} - 5(1-2x)^{\frac{1}{2}} + C$

7. $\int \frac{3x^4}{\sqrt{2x^5+1}}\,dx = \frac{3}{5}\left(2x^5+1\right)^{\frac{1}{2}} + C$

8. $\int \frac{1-x}{1+2x}\,dx = \frac{3}{4}\ln|1+2x| - \frac{1}{4}(1+2x) + C$

9. $\int \frac{6x^2}{2x+3}\,dx = \frac{3}{8}(2x+3)^2 - \frac{9}{2}(2x+3) + \frac{27}{4}\ln|2x+3| + C$

10. $\int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}\sqrt{x^{\frac{1}{2}}-1}}\,dx = 4\sqrt{x^{\frac{1}{2}}-1} + C$

1. $\int 6x(3x-1)^3\,dx = \int 6x\,u^3\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int (2u+2)\,u^3\,du =$

$\frac{2}{3}\int u^4+u^3\,du = \frac{2}{3}\left[\frac{1}{5}u^5+\frac{1}{4}u^4\right] = \frac{2}{15}u^5+\frac{1}{6}u^4+C$

$= \frac{2}{15}(3x-1)^5+\frac{1}{6}(3x-1)^4+C$

$u = 3x-1$, $\frac{du}{dx} = 3$, $dx = \frac{du}{3}$, $3x = u+1$, $6x = 2u+2$

2. $\int \frac{5x}{5x-1}\,dx = \int \frac{5x}{u}\times\frac{du}{5} = \int \frac{u+1}{u}\times\frac{du}{5}$

$= \frac{1}{5}\int 1+\frac{1}{u}\,du = \frac{1}{5}\left[u+\ln|u|\right] = \frac{1}{5}(5x-1)+\frac{1}{5}\ln|5x-1|+C$

$u = 5x-1$, $\frac{du}{dx} = 5$, $dx = \frac{du}{5}$, $5x = u+1$

3. $\int 3x(x^2+1)^{\frac{1}{2}}\,dx = \int 3x\,u^{\frac{1}{2}}\,\frac{du}{2x} = \int \frac{3}{2}u^{1/2}\,du$

$\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2}+C = (x^2+1)^{3/2}+C$

$u = x^2+1$, $\frac{du}{dx} = 2x$, $dx = \frac{du}{2x}$

4. $\int \frac{3x^2}{2x^3+1}\,dx = \int \frac{3x^2}{u}\times\frac{du}{6x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du$

$= \frac{1}{2}\ln|u|+C = \frac{1}{2}\ln|2x^3+1|+C$

$u = 2x^3+1$, $\frac{du}{dx} = 6x^2$, $dx = \frac{du}{6x^2}$

5. $\int x(2x-1)^5\,dx = \int x\,u^5\,\frac{du}{2} = \int \frac{u+1}{2}u^5\times\frac{du}{2}$

$= \frac{1}{4}\int (u+1)u^5\,du = \frac{1}{4}\int u^6+u^5\,du$

$= \frac{1}{4}\left[\frac{1}{7}u^7+\frac{1}{6}u^6\right] = \frac{1}{28}u^7+\frac{1}{24}u^6$

$= \frac{1}{28}(2x-1)^7+\frac{1}{24}(2x-1)^6+C$

$u = 2x-1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $u+1 = 2x$, $x = \frac{u+1}{2}$

6. $\int \frac{10x}{\sqrt{1-2x}}\,dx = \int \frac{10x}{\sqrt{u}}\times\frac{du}{-2} = \int \frac{5-5u}{u^{\frac{1}{2}}}\times\frac{du}{-2}$

$= -\frac{1}{2}\int \frac{5}{u^{\frac{1}{2}}}-\frac{5u}{u^{\frac{1}{2}}}\,du = -\frac{1}{2}\int 5u^{-\frac{1}{2}}-5u^{\frac{1}{2}}\,du = -\frac{1}{2}\left(10u^{\frac{1}{2}}-\frac{5}{\frac{3}{2}}u^{\frac{3}{2}}\right)$

$= -5u^{\frac{1}{2}}+\frac{5}{3}u^{\frac{3}{2}}+C = \frac{5}{3}(1-2x)^{\frac{3}{2}}-5(1-2x)^{\frac{1}{2}}$

$u = 1-2x$, $\frac{du}{dx} = -2$, $dx = \frac{du}{-2}$, $2x = 1-u$, $10x = 5-5u$

7. $\int \frac{3x^2}{\sqrt{2x^3+1}}\,dx = \int \frac{3x^2}{u^{\frac{1}{2}}}\,\frac{du}{6x^2} = \int \frac{3}{10}u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$= \frac{3}{10}\left[2u^{\frac{1}{2}}\right]+C = \frac{3}{5}u^{\frac{1}{2}}+C = \frac{3}{5}(2x^3+1)^{\frac{1}{2}}+C$

$u = 2x^3+1$, $\frac{du}{dx} = 6x^2$, $dx = \frac{du}{6x^2}$

8. $\int \frac{1-x}{1+2x}\,dx = \int \frac{1-x}{u}\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{1-\frac{u-1}{2}}{u}\,du$ (MULTIPLY TOP & BOTTOM BY 2)

$= \frac{1}{2}\int \frac{2-(u-1)}{2u}\,du = \frac{1}{4}\int \frac{2-u+1}{u}\,du = \frac{1}{4}\int \frac{3-u}{u}\,du$

$= \frac{1}{4}\int \frac{3}{u}-1\,du = \frac{1}{4}\left(3\ln|u|-u\right)+C = \frac{3}{4}\ln|1+2x|-\frac{1}{4}(1+2x)+C$

$u = 1+2x$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u-1$, $x = \frac{u-1}{2}$

9. $\int \frac{6x^2}{2x+3}\,dx = \int \frac{3\frac{u^2-6u+9}{4}}{u}\,\frac{du}{2} = \int \frac{3\left(\frac{u^2-6u+9}{4}\right)}{4u}\,du$

$= \int \frac{3u^2-18u+27}{8u}\,du = \int \frac{3u^2-18u+27}{4u}\,du = \frac{1}{4}\int \frac{3u^2-18u+27}{u}\,du$

$= \frac{1}{4}\int 3u-18+\frac{27}{u}\,du = \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2}u^2-18u+27\ln|u|\right]+C$

$= \frac{3}{8}u^2-\frac{9}{2}u+\frac{27}{4}\ln|u|+C = \frac{3}{8}(2x+3)^2-\frac{9}{2}(2x+3)+\frac{27}{4}\ln|2x+3|+C$

$u = 2x+3$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u-3$, $4x^2 = u^2-6u+9$, $x^2 = \frac{u^2-6u+9}{4}$

10. $\int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}\sqrt{x^{\frac{1}{2}}-1}}\,dx = \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}\,u^{\frac{1}{2}}}\,\frac{2x^{\frac{1}{2}}}{u^{\frac{1}{2}}}\,du = \int \frac{2}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$\int 2u^{-\frac{1}{2}}\,du = 4u^{\frac{1}{2}}+C = 4(x^{\frac{1}{2}}-1)^{\frac{1}{2}}+C$

$u = x^{\frac{1}{2}}-1$, $\frac{du}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$, $\frac{du}{dx} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}$, $2x^{\frac{1}{2}}\,du = dx$

Question 3

Carry out the following integrations **by substitution** only.

1. $\int 10x(5x-3)^3\,dx = \frac{2}{25}(5x-3)^5 + \frac{3}{10}(5x-3)^4 + C$

2. $\int \frac{12x}{2x-1}\,dx = 3(2x-1) + 3\ln|2x-1| + C$

3. $\int x(x^2-1)^{\frac{5}{2}}\,dx = \frac{1}{7}(x^2-1)^{\frac{7}{2}} + C$

4. $\int \frac{5x^5}{2x^6+7}\,dx = \frac{5}{12}\ln|2x^6+7| + C$

5. $\int 2x(1-5x)^4\,dx = -\frac{2}{125}(1-5x)^5 + \frac{1}{75}(1-5x)^6 + C$

6. $\int \frac{9x}{\sqrt{4x^2+1}}\,dx = \frac{9}{4}\sqrt{4x^2+1} + C$

7. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{4x-1}}\,dx = \frac{1}{8}(4x-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}(4x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

8. $\int \frac{1-2x}{1+3x}\,dx = \frac{5}{9}\ln|1+3x| - \frac{2}{9}(1+3x) + C$

9. $\int \frac{6x^{\frac{1}{2}}}{2x^{\frac{3}{2}}+3}\,dx = 2\ln\left|2x^{\frac{3}{2}}+3\right| + C$

10. $\int \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1-3x^{\frac{5}{2}}}}\,dx = -\frac{4}{15}\sqrt{1-3x^{\frac{5}{2}}} + C$

1. $\int 10x(5x-3)^3\,dx = \int (2u+6)u^3 \frac{du}{5} = \frac{1}{5}\int 2u^4 + 6u^3\,du$

$= \frac{1}{5}\left[\frac{2}{5}u^5 + \frac{3}{2}u^4\right] = \frac{2}{25}u^5 + \frac{3}{10}u^4 + C$

$= \frac{2}{25}(5x-3)^5 + \frac{3}{10}(5x-3)^4 + C$

$u = 5x-3$, $\frac{du}{dx} = 5$, $dx = \frac{du}{5}$, $5x = u+3$, $10x = 2u+6$

2. $\int \frac{12x}{2x-1}\,dx = \int \frac{6\cdot 2x}{u}\cdot\frac{du}{2} = \int \frac{6u}{u}\,du = \int \frac{3u+3}{u}\,du$

$= \int 3 + \frac{3}{u}\,du = 3u + 3\ln|u| + C = 3(2x-1) + 3\ln|2x-1| + C$

$u = 2x-1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u+1$, $6x = 3u+3$

3. $\int x(x^2-1)^{\frac{5}{2}}\,dx = \int x u^{\frac{5}{2}} \times \frac{du}{2x} = \int \frac{1}{2}u^{\frac{5}{2}}\,du$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{7}u^{\frac{7}{2}} + C = \frac{1}{7}(x^2+1)^{\frac{7}{2}} + C$

$u = x^2+1$, $\frac{du}{dx} = 2x$, $dx = \frac{du}{2x}$

4. $\int \frac{5x^5}{2x^6+7}\,dx = \int \frac{5x^5}{u}\times\frac{du}{12x^5} = \frac{5}{12}\int \frac{1}{u}\,du$

$= \frac{5}{12}\ln|u| + C = \frac{5}{12}\ln|2x^6+7| + C$

$u = 2x^6+7$, $\frac{du}{dx} = 12x^5$, $dx = \frac{du}{12x^5}$

5. $\int 2x(1-5x)^4\,dx = \int 2x u^4 \times \frac{du}{-5} = -\frac{2}{5}\int 2x u^4\,du$

$= -\frac{2}{5}\int \frac{1-u}{5}\times u^4\,du = -\frac{2}{25}\int (1-u)u^4\,du = -\frac{2}{25}\int u^4 - u^5\,du$

$= -\frac{2}{25}\left[\frac{1}{5}u^5 - \frac{1}{6}u^6\right] + C = -\frac{2}{125}u^5 + \frac{1}{75}u^6 + C$

$= \frac{1}{75}(1-5x)^6 - \frac{2}{125}(1-5x)^5 + C$

$u = 1-5x$, $\frac{du}{dx} = -5$, $dx = \frac{du}{-5}$, $6x = 1-u$, $x = \frac{1-u}{5}$

6. $\int \frac{9x}{\sqrt{4x^2+1}}\,dx = \int \frac{9x}{u^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{du}{8x} = \frac{9}{8}\int \frac{1}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$\frac{9}{8}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{9}{8}\left(2u^{\frac{1}{2}}\right) + C = \frac{9}{4}u^{\frac{1}{2}} + C$

$= \frac{9}{4}\sqrt{4x^2+1} + C$

$u = 4x^2+1$, $\frac{du}{dx} = 8x$, $dx = \frac{du}{8x}$

7. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{4x-1}}\,dx = \int \frac{3x-1}{u^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{du}{4} = \frac{1}{4}\int \frac{3\left(\frac{u+1}{4}\right)-1}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

MULTIPLY TOP AND BOTTOM OF THE FRACTION BY 4

$= \int \frac{3(u+1)-4}{4u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{4}\int \frac{3u-1}{4u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{16}\int \frac{3u}{u^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$= \frac{1}{16}\int 3u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{16}\left[2u^{\frac{3}{2}} - 2u^{\frac{1}{2}}\right] = \frac{1}{8}u^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}u^{\frac{1}{2}} + C$

$= \frac{1}{8}(4x-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}(4x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 4x-1$, $\frac{du}{dx} = 4$, $dx = \frac{du}{4}$, $4x = u+1$, $x = \frac{u+1}{4}$

8. $\int \sqrt{\frac{1-2x}{1+3x}}\,dx = \int \frac{1-2x}{u}\cdot\frac{du}{3} = \int \frac{1-2\left(\frac{u-1}{3}\right)}{u}\,du$

MULTIPLY TOP AND BOTTOM OF THE FRACTION BY 3

$= \frac{1}{3}\int \frac{3-2(u-1)}{3u}\,du = \frac{1}{9}\int \frac{3-2u+2}{u}\,du = \frac{1}{9}\int \frac{5-2u}{u}\,du$

$= \frac{1}{9}\int \frac{5}{u} - 2\,du = \frac{1}{9}\left[5\ln|u| - 2u\right] + C = \frac{5}{9}\ln|u| - \frac{2}{9}u + C$

$= \frac{5}{9}\ln|1+3x| - \frac{2}{9}(1+3x) + C$

$u = 1+3x$, $u-1 = 3x$, $x = \frac{u-1}{3}$, $\frac{du}{dx} = 3$, $dx = \frac{du}{3}$

9. $\int \frac{6x^{\frac{1}{2}}}{2x^{\frac{3}{2}}+3}\,dx = \int \frac{6x^{\frac{1}{2}}}{u}\cdot\frac{du}{3x^{\frac{1}{2}}} = \int \frac{2}{u}\,du$

$= 2\ln|u| + C = 2\ln|2x^{\frac{3}{2}}+3| + C$

$u = 2x^{\frac{3}{2}}+3$, $\frac{du}{dx} = 3x^{\frac{1}{2}}$, $dx = \frac{du}{3x^{\frac{1}{2}}}$

10. $\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{1-3x^{\frac{3}{2}}}}\,dx = \int \frac{\cancel{x^{\frac{1}{2}}}}{\sqrt{u}}\cdot\frac{2\,du}{-15\cancel{x^{\frac{1}{2}}}}$

$= -\frac{2}{15}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du = -\frac{2}{15}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$= -\frac{2}{15}\left(2u^{\frac{1}{2}}\right) + C = -\frac{4}{15}u^{\frac{1}{2}} + C = -\frac{4}{15}\sqrt{1-3x^{\frac{3}{2}}} + C$

$u = 1-3x^{\frac{3}{2}}$, $\frac{du}{dx} = -\frac{9}{2}x^{\frac{1}{2}}$, $2\,du = -15x^{\frac{1}{2}}\,dx$, $dx = \frac{2\,du}{-15x^{\frac{1}{2}}}$

Question 4

Carry out the following integrations to the answers given, **by using substitution** only.

1. $\int_0^{\frac{1}{2}} 8x(2x-1)^4 \, dx = \frac{1}{15}$

2. $\int_2^3 \frac{3x}{3x-5} \, dx = 1 + \frac{10}{3}\ln 2$

3. $\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \, dx = \frac{1}{5}$

4. $\int_0^1 \frac{4x}{x^2+1} \, dx = 2\ln 2$

5. $\int_1^3 2x(3x-1)^4 \, dx = \frac{55808}{5}$

6. $\int_4^8 \frac{6x}{\sqrt{2x-7}} \, dx = 68$

7. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{9-5x^2}} \, dx = \frac{1}{5}$

8. $\int_0^3 \frac{5-2x}{x+1} \, dx = 14\ln 2 - 6$

9. $\int_0^{\frac{1}{5}} \frac{10x^2}{5x+1} \, dx = \frac{\ln 4 - 1}{25}$

10. $\int_{-\frac{3}{2}}^{-\frac{1}{2}} \frac{5x-2}{2x-5} \, dx = \frac{5}{2} + \frac{21}{4}\ln\left(\frac{3}{4}\right)$

1. $\int_0^{\frac{1}{2}} 8x(2x-1)^4\,dx = \int_{-1}^{0} 8\left(\frac{u}{2}\right)u^4\,\frac{du}{2} = \int_{-1}^{0} 4xu^4\,du$

$= \int_{-1}^{0} (2u+1)u^4\,du = \int_{-1}^{0} 2u^5 + u^4\,du = \left[\frac{1}{3}u^6 + \frac{2}{5}u^5\right]_{-1}^{0}$

$= [0] - \left[\frac{1}{3} - \frac{2}{5}\right] = 0 - \left(-\frac{1}{15}\right) = \frac{1}{15}$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=0,\ u=-1$
$x=\frac{1}{2},\ u=0$
$8x = 4u+4$
$4x = 2u+2$

2. $\int_2^3 \frac{3x}{3x-5}\,dx = \int_1^4 \frac{3x}{u}\,\frac{du}{3} = \int_1^4 \frac{u+5}{u}\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int_1^4 \frac{u+5}{u}\,du$

$= \frac{1}{3}\int_1^4 1 + \frac{5}{u}\,du = \frac{1}{3}\left[u + 5\ln|u|\right]_1^4 = \frac{1}{3}\left[(4+5\ln 4) - (1+5\ln 1)\right]$

$= \frac{1}{3}(3 + 5\ln 4) = 1 + \frac{5}{3}\ln 4 = 1 + \frac{10}{3}\ln 2$

$u = 3x-5$
$\frac{du}{dx} = 3$
$dx = \frac{du}{3}$
$x=2\quad u=1$
$x=3\quad u=4$
$3x = u+5$

3. $\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx = \int_1^0 x u^{\frac{3}{2}}\,\frac{du}{-2x} = \int_1^0 -\frac{1}{2}u^{\frac{3}{2}}\,du$

$\int_0^1 \frac{1}{2}u^{\frac{3}{2}}\,du = \left[\frac{1}{5}u^{\frac{5}{2}}\right]_0^1 = \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$

$u = 1-x^2$
$\frac{du}{dx} = -2x$
$dx = \frac{du}{-2x}$
$x=0\quad u=1$
$x=1\quad u=0$

4. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+1}\,dx = \int_1^2 \frac{dx^2}{u} \times \frac{du}{2x^2} = \int_1^2 \frac{2}{u}\,du$

$\left[2\ln|u|\right]_1^2 = 2\ln 2 - 2\ln 1 = 2\ln 2$

$u = x^2+1$
$\frac{du}{dx} = 2x$
$dx = \frac{du}{2x}$
$x=0\quad u=1$
$x=1\quad u=2$

5. $\int_1^3 2x(3x-1)^6\,dx = \int_2^8 2x\,u^6\,\frac{du}{3} = \frac{2}{3}\int_2^8 2u^6\,du$

$= \frac{2}{3}\int_2^8 \frac{u+1}{3}u^6\,du = \frac{2}{9}\int_2^8 (u+1)u^6\,du = \frac{2}{9}\int_2^8 u^7 + u^6\,du$

$= \frac{2}{9}\left[\frac{1}{4}u^8 + \frac{1}{7}u^7\right]_2^8 = \frac{2}{9}\left(\left(\frac{8192}{4} + \frac{32768}{7}\right) - \left(\frac{256}{4} + \frac{128}{7}\right)\right)$

$= \frac{55648}{5}$

$u = 3x-1$
$\frac{du}{dx} = 3$
$dx = \frac{du}{3}$
$x=1\quad u=2$
$x=3\quad u=8$
$3x = u+1$
$x = \frac{u+1}{3}$

6. $\int_4^8 \frac{6x}{\sqrt{2x-7}}\,dx = \int_1^9 \frac{6x}{u^{\frac{1}{2}}}\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_1^9 \frac{3u+21}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$= \frac{1}{2}\int_1^9 \frac{3u}{u^{\frac{1}{2}}} + \frac{21}{u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{2}\int_1^9 3u^{\frac{1}{2}} + 21u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{2}\left[2u^{\frac{3}{2}} + 42u^{\frac{1}{2}}\right]_1^9$

$= \frac{1}{2}\left[(54+126) - (2+42)\right] = \frac{1}{2} \times 136 = 68$

$u = 2x-7$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=4\quad u=1$
$x=8\quad u=9$
$3x = u+7$
$6x = 3u+21$

7. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{9-5x^2}}\,dx = \int_9^4 \frac{x}{u^{\frac{1}{2}}}\,\frac{du}{-10x} = \frac{1}{10}\int_4^9 u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{10}\left[2u^{\frac{1}{2}}\right]_4^9$

$= \frac{1}{10}\left[6-4\right] = \frac{1}{10} \times 2 = \frac{1}{5}$

$u = 9-5x^2$
$\frac{du}{dx} = -10x$
$dx = \frac{du}{-10x}$
$x=0\quad u=9$
$x=1\quad u=4$

8. $\int_0^3 \frac{5-2x}{2x-1}\,dx = \int_1^4 \frac{5-2x}{u}\,du = \int_1^4 \frac{5-2(u-1)}{u}\,du = \int_1^4 \frac{7-2u}{u}\,du$

$= \int_1^4 \frac{7}{u} - 2\,du = \left[7\ln|u| - 2u\right]_1^4 = (7\ln 4 - 8) - (0-2) =$

$= 7\ln 4 - 8 + 2 = 7\ln 4 - 6 = 14\ln 2 - 6$

$u = 2x+1$
$\frac{du}{dx} = 1$
$du = dx$
$x=0\quad u=1$
$x=3\quad u=4$
$2x = u-1$

9. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{10x^2}{5x+1}\,dx = \int_1^3 \frac{10x^2}{u}\,\frac{du}{5} = \int_1^3 \frac{2x^2}{u}\,dx$

$\int_1^2 \frac{2\left(\frac{u-1}{5}\right)^2}{u}\,du = \int_1^2 \frac{2\left(\frac{u^2-2u+1}{25}\right)}{u}\,du = \int_1^2 \frac{\frac{2u^2-4u+2}{25}}{u}\,du$

$= \int_1^2 \frac{2u^2-4u+2}{25u}\,du = \frac{1}{25}\int_1^2 2u - 4 + \frac{2}{u}\,du = \frac{1}{25}\left[u^2 - 4u + 2\ln|u|\right]_1^2$

$= \frac{1}{25}\left[(4-8+2\ln 2) - (1-4+0)\right] = \frac{1}{25}\left[-4+2\ln 2+3\right] = \frac{2\ln 2 - 1}{25} = \frac{\ln 4 - 1}{25}$

$u = 5x+1$
$\frac{du}{dx} = 5$
$dx = \frac{du}{5}$
$x=0\quad u=1$
$x=\frac{1}{2}\quad u=2$
$5x = u-1$

10. $\int_{\frac{1}{2}}^{-2} \frac{5x-2}{2x-5}\,dx = \int_{-4}^{-6} \frac{5x-2}{u}\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_{-4}^{-6} \frac{5\left(\frac{u+5}{2}\right)-2}{u}\,du$ MULTIPLY TOP & BOTTOM BY 2

$= \frac{1}{4}\int_0^{-6} \frac{5(u+5)-4}{2u} = \frac{1}{4}\int_0^{-6} \frac{5u+25-4}{u}\,du = \frac{1}{4}\int_{-4}^{-6} \frac{5u+21}{u}\,du = \frac{1}{4}\int_{-4}^{-6} 5 + \frac{21}{u}\,du$

$= \frac{1}{4}\left[5u + 21\ln|u|\right]_{-4}^{-6} = \frac{1}{4}\left[(-30+21\ln|-6|) - (-20+21\ln|-4|)\right]$

$= \frac{1}{4}\left[10 + 21\ln 6 - 21\ln 4\right] = \frac{5}{2} + \frac{21}{4}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

$u = 2x-5$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=\frac{1}{2}\quad u=-4$
$x=-2\quad u=-9$
$2x = u+5$

Question 5

Carry out the following integrations to the answers given, **by using substitution** only.

1. $\int_0^{\frac{3}{2}} 2x(2x-3)^4 \, dx = \frac{243}{20}$

2. $\int_0^{2} \frac{4x}{4x+1} \, dx = 2 - \frac{1}{2}\ln 3$

3. $\int_0^{1} x^2\left(1-x^3\right)^{\frac{9}{2}} \, dx = \frac{2}{33}$

4. $\int_0^{4} \frac{12x}{x^2+9} \, dx = 12\ln\left(\frac{5}{3}\right)$

5. $\int_1^{2} 2x(3x-1)^4 \, dx = \frac{3569}{5}$

6. $\int_2^{6} \frac{6x}{\sqrt{3x-2}} \, dx = \frac{272}{9}$

7. $\int_0^{1} \frac{x}{\sqrt{16-7x^2}} \, dx = \frac{1}{7}$

8. $\int_5^{6} \frac{1-2x}{x-4} \, dx = -2 - 7\ln 2$

9. $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{9x^2}{3x+1} \, dx = \frac{\ln 4 - 1}{6}$

10. $\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{2x-3}{2x+3} \, dx = \frac{3}{2}(1-\ln 4)$

1. $\int_0^{\frac{3}{2}} 2x(2x-3)^4\,dx = \int_{-3}^{0} 2x\,u^4\,\frac{du}{2} = \int_{-3}^{0} (u+3)u^4 \times \frac{1}{2}\,du$

$= \frac{1}{2}\int_{-3}^{0} u^5 + 3u^4\,du = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{6}u^6 + \frac{3}{5}u^5\right]_{-3}^{0} = \frac{1}{2}\left[(0) - \left(\frac{243}{2} - \frac{729}{5}\right)\right]$

$= \frac{1}{2} \times \frac{243}{10} = \frac{243}{20}$

$u = 2x-3$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u-3$
$x=0 \quad u=-3$
$x=\frac{3}{2} \quad u=0$

2. $\int_0^2 \frac{1}{4x+1}\,dx = \int_1^9 \frac{1}{u}\,\frac{du}{4} = \frac{1}{4}\int_1^9 \frac{u-1}{u}\,du$

$= \frac{1}{4}\int_1^9 1 - \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{4}\left[u - \ln|u|\right]_1^9 = \frac{1}{4}\left[(9-\ln 9) - (1-\ln 1)\right]$

$= \frac{1}{4}\left[8 - \ln 9\right] = 2 - \frac{1}{4}\ln 9 = 2 - \frac{1}{2}\ln 3$

$u = 4x+1$
$\frac{du}{dx} = 4$
$dx = \frac{du}{4}$
$du = u-1$
$x=0 \quad u=1$
$x=2 \quad u=9$

3. $\int_0^1 x^2(1-x^3)^{\frac{4}{3}}\,dx = \int_1^0 x^2 u^{\frac{4}{3}}\,\frac{du}{-3x^2} = \frac{1}{3}\int_0^1 u^{\frac{4}{3}}\,du$

$= \frac{1}{3}\left[\frac{3}{11}u^{\frac{11}{3}}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\left[\frac{3}{11} - 0\right] = \frac{1}{11}$

$u = 1-x^3$
$\frac{du}{dx} = -3x^2$
$dx = \frac{du}{-3x^2}$
$x=0 \quad u=1$
$x=1 \quad u=0$

4. $\int_0^4 \frac{12x}{x^2+9}\,dx = \int_9^{25} \frac{12x}{u}\,\frac{du}{2x} = \int_9^{25} \frac{6}{u}\,du =$

$= \left[6\ln|u|\right]_9^{25} = 6\left[\ln 25 - \ln 9\right] = 6\left[\ln\frac{25}{9}\right]$

$= 6\ln\left(\frac{5}{3}\right)^2 = 12\ln\frac{5}{3}$

$u = x^2+9$
$\frac{du}{dx} = 2x$
$dx = \frac{du}{2x}$
$x=0 \quad u=9$
$x=4 \quad u=25$

5. $\int_1^2 2x(3x-1)^4\,dx = \int_{-2}^{5} 3x\,u^4\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int_{-2}^{5} 3x\,u^4\,du$

$= \frac{1}{3}\int_{-2}^{5} \frac{u+1}{3} \times u^4\,du = \frac{1}{9}\int_{-2}^{5} u^5 + u^4\,du = \frac{1}{9}\left[\frac{1}{6}u^6 + \frac{1}{5}u^5\right]_{-2}^{5}$

$= \frac{1}{9}\left[\frac{19375}{6} - \frac{256}{15}\right] = \frac{3509}{5}$

$u = 3x-1$
$\frac{du}{dx} = 3$
$dx = \frac{du}{3}$
$3x = u+1$
$x = \frac{u+1}{3}$
$x=1 \quad u=2$
$x=2 \quad u=5$

6. $\int_2^6 \frac{6x}{\sqrt{3x-2}}\,dx = \int_4^{16} \frac{6x}{u^{1/2}}\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int_4^{16} \frac{2(u+2)}{u^{1/2}}\,du$

$= \frac{2}{3}\int_4^{16} u^{\frac{1}{2}} + 2u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{2}{3}\int_4^{16} u^{\frac{1}{2}} + 4u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{2}{3}\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + 4u^{\frac{1}{2}}\right]_4^{16}$

$= \frac{2}{3}\left[\left(\frac{128}{3} + 16\right) - \left(\frac{16}{3} + 8\right)\right] = \frac{2}{3} \times \frac{136}{3} = \frac{272}{9}$

$u = 3x-2$
$\frac{du}{dx} = 3$
$dx = \frac{du}{3}$
$3x = u+2$
$x=2 \quad u=4$
$x=6 \quad u=16$

7. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{16-7x}}\,dx = \int_{16}^{9} \frac{x}{\sqrt{u}}\,\frac{du}{-7x} = \frac{1}{7}\int_9^{16} u^{-\frac{1}{2}}\,du =$

$= \frac{1}{7}\left[2u^{\frac{1}{2}}\right]_9^{16} = \frac{1}{7}\left[16^{\frac{1}{2}} - 9^{\frac{1}{2}}\right] = \frac{1}{7}(4-3) = \frac{1}{7}$

$u = 16-7x$
$\frac{du}{dx} = -7x$
$dx = \frac{du}{-7x}$
$x=0 \quad u=16$
$x=1 \quad u=9$

8. $\int_3^6 \frac{1-2x}{x-4}\,dx = \int_1^2 \frac{1-2(u+4)}{u}\,du = \int_1^2 \frac{1-2u-8}{u}\,du$

$= \int_1^2 \frac{-2u-7}{u}\,du = \int_1^2 \frac{2u+7}{u}\,du = \int_1^2 2 + \frac{7}{u}\,du = \left[2u + 7\ln|u|\right]_1^2$

$= (2 + 7\ln 2) - (4 + 7\ln 2) = -2 - 7\ln 2$

$u = x-4$
$\frac{du}{dx} = 1$
$dx = du$
$x = u+4$
$x=3 \quad u=1$
$x=6 \quad u=2$

9. $\int_0^3 \frac{9x^2}{3x+1}\,dx = \int_1^2 \frac{(u-1)^2}{u}\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{u^2-2u+1}{u}\,du$

$= \frac{1}{3}\int_1^2 u - 2 + \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{2}u^2 - 2u + \ln|u|\right]_1^2$

$= \frac{1}{3}\left[(2 - 4 + \ln 2) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \ln 1\right)\right] = \frac{1}{3}\left[(-2 + \ln 2) - \left(-\frac{3}{2}\right)\right]$

$= \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2} + \ln 2\right) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\ln 2 \quad \text{or} \quad = \frac{1}{6}\left(-1 + 2\ln 2\right) = \frac{\ln 4 - 1}{6}$

$u = 3x+1$
$\frac{du}{dx} = 3$
$dx = \frac{du}{3}$
$9x^2 = (u-1)^2$
$x=0 \quad u=1$
$x=\frac{1}{3} \quad u=2$

10. $\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{2x-3}{2x+3}\,dx = \int_3^6 \frac{2u-3}{u}\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_3^6 \frac{(u-3)-3}{u}\,du$

$= \frac{1}{2}\int_3^6 \frac{u-6}{u}\,du = \frac{1}{2}\int_3^6 1 - \frac{6}{u}\,du = \frac{1}{2}\left[u - 6\ln|u|\right]_3^6$

$= \frac{1}{2}\left[(6 - 6\ln 6) - (3 - 6\ln 3)\right] = \frac{1}{2}\left[3 + 6\ln 3 - 6\ln 6\right]$

$= \frac{1}{2}\left[3 + 6\ln\left(\frac{3}{6}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[3 + 6\ln\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[3 - 6\ln 2\right]$

$= \frac{3}{2}\left(1 - 2\ln 2\right) = \frac{3}{2}\left(1 - \ln 4\right)$

$u = 2x+3$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u-3$
$x=0 \quad u=3$
$x=0 \quad u=6$

Question 6

Carry out the following integrations.

1. $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,dx = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - 2(x+1)^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3}(x-2)\sqrt{x+1} + C$

2. $\int \frac{2x}{(2x+1)^3}\,dx = -\frac{1}{2}(2x+1)^{-1} + \frac{1}{4}(2x+1)^{-2} + C = -\frac{4x+1}{4(2x+1)^2} + C$

3. $\int \frac{x}{x+1}\,dx = x - \ln|x+1| + C = x + 1 - \ln|x+1| + C$

4. $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}}\,dx = \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + 2(x-1)^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3}(x+2)\sqrt{x-1} + C$

5. $\int \frac{4x+1}{2x-5}\,dx = 2x + \frac{11}{2}\ln|2x-5| + C$

6. $\int \frac{x^2}{2x-1}\,dx = \frac{1}{16}(2x-1)^2 + \frac{1}{4}(2x-1) + \frac{1}{8}\ln|2x-1| + C = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}\ln|2x-1| + C$

7. $\int \frac{2x+1}{2x-1}\,dx = \frac{1}{2}(2x-1) + \ln|2x-1| + C = x + \ln|2x-1| + C$

8. $\int \frac{6x}{\sqrt{2x+3}}\,dx = (2x+3)^{\frac{3}{2}} - 9(2x+3)^{\frac{1}{2}} + C = 2(x-3)\sqrt{2x+3} + C$

9. $\int \frac{3x-1}{2x+3}\,dx = \frac{3}{4}(2x-3) - \frac{11}{4}\ln|2x+3| + C = \frac{3}{2}x - \frac{11}{4}\ln|2x+3| + C$

10. $\int \frac{8x^2}{1-2x}\,dx = -\frac{1}{2}(1-2x)^2 + 2(1-2x) - \ln|1-2x| + C = -2x^2 - 2x - \ln|1-2x| + C$

1. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{2x+1}}\,dx = \int \frac{u-1}{\sqrt{u}}\,du = \int \frac{u-1}{u^{1/2}}\,du$

$\displaystyle = \int u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} - 2u^{\frac{1}{2}} + C$

$\displaystyle = \frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}} - 2(2x+1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 2x+1$
$\frac{du}{dx} = 1$
$dx = du$

2. $\displaystyle\int \frac{2x}{(2x+1)^3}\,dx = \int \frac{2x}{u^3}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{u-1}{u^3}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int \frac{u}{u^3} - \frac{1}{u^3}\,du = \frac{1}{2}\int u^{-2} - u^{-3}\,du = \frac{1}{2}\left(-u^{-1} + \frac{1}{2}u^{-2}\right)$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2u^2} - \frac{1}{u}\right] + C = \frac{1}{4(2x+1)^2} - \frac{1}{2(2x+1)} + C$

$u = 2x+1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u-1$

3. $\displaystyle\int \frac{x}{x+1}\,dx = \int \frac{x}{u}\,du = \int \frac{u-1}{u}\,du = \int 1 - \frac{1}{u}\,du$

$= u - \ln|u| + C = (x+1) - \ln|x+1| + C$

$u = x+1$
$\frac{du}{dx} = 1$
$dx = du$
$x = u-1$

4. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{2x+1}}\,dx = \int \frac{x}{\sqrt{u}}\,du = \int \frac{u-1}{u^{1/2}}\,du = \int u^{\frac{1}{2}} + u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$\displaystyle = \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + 2u^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3}(2x-1)^{\frac{3}{2}} + 2(2x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 1$
$dx = du$
$x = u+1$

5. $\displaystyle\int \frac{4x+1}{2x-5}\,dx = \int \frac{4x+1}{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{2u+11}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int 2 + \frac{11}{u}\,du = \frac{1}{2}\int 2 + \frac{11}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\left[2u + 11\ln|u|\right] + C = u + \frac{11}{2}\ln|u| + C$

$= (2x-5) + \frac{11}{2}\ln|2x-5| + C$

$u = 2x-5$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u+5$
$4x = 2u+10$
$4x+1 = 2u+11$

6. $\displaystyle\int \frac{x^2}{2x-1}\,dx = \int \frac{x^2}{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{(u+1)^2}{4}}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int \frac{(u+1)^2}{4u}\,du = \frac{1}{8}\int \frac{(u+1)^2}{u}\,du = \frac{1}{8}\int \frac{u^2+2u+1}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{8}\int u + 2 + \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}u^2 + 2u + \ln|u|\right) + C$

$\displaystyle = \frac{1}{16}u^2 + \frac{1}{4}u + \frac{1}{8}\ln|u| + C = \frac{1}{16}(2x-1)^2 + \frac{1}{4}(2x-1) + \frac{1}{8}\ln|2x-1| + C$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u+1$
$4x^2 = (u+1)^2$
$x^2 = \frac{(u+1)^2}{4}$

7. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{2x-1}\,dx = \int \frac{(u+1)+1}{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{u+2}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int 1 + \frac{2}{u}\,du = \frac{1}{2}\left(u + 2\ln|u|\right) + C = \frac{1}{2}u + \ln|u| + C$

$= \frac{1}{2}(2x-1) + \ln|2x-1| + C$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u+1$

8. $\displaystyle\int \frac{6x}{\sqrt{2x+3}}\,dx = \int \frac{3u-9}{u^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{3u}{u^{\frac{1}{2}}} - \frac{9}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int 3u^{\frac{1}{2}} - 9u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{2}\left[2u^{\frac{3}{2}} - 18u^{\frac{1}{2}}\right] + C$

$= u^{\frac{3}{2}} - 9u^{\frac{1}{2}} + C = (2x+3)^{\frac{3}{2}} - 9(2x+3)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 2x+3$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u-3$
$6x = 3u-9$

9. $\displaystyle\int \frac{3x-1}{2x+3}\,dx = \int \frac{3\left(\frac{u-3}{2}\right)-1}{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{3u-9}{2}-1}{u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{3u-9}{2} - \frac{2}{2}}{u}\,du = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{3u-11}{2}}{u}\,du = \frac{1}{2}\int \frac{3u-11}{2u}\,du$

$\displaystyle = \frac{1}{4}\int \frac{3u}{u} - \frac{11}{u}\,du = \frac{1}{4}\int 3 - \frac{11}{u}\,du = \frac{1}{4}\left(3u - 11\ln|u| + C\right)$

$= \frac{3}{4}u - \frac{11}{4}\ln|2x+3| + C$

$u = 2x+3$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$2x = u-3$
$x = \frac{u-3}{2}$

10. $\displaystyle\int \frac{6x^2}{1-2x}\,dx = \int \frac{6x^2}{u}\times\frac{du}{-2x} = -\int \frac{4x^2}{u}\,du$

$\displaystyle = -\int \frac{(1-u)^2}{u}\,du = -\int \frac{1-2u+u^2}{u}\,du = -\int \frac{1}{u} - 2 + u\,du$

$\displaystyle = \int -\frac{1}{u} + 2 - u\,du = -\ln|u| + 2u - \frac{1}{2}u^2 + C$

$= -\frac{1}{2}(1-2x)^2 + 2(1-2x) - \ln|1-2x| + C$

$u = 1-2x$
$2x = 1-u$
$\frac{du}{dx} = -2$
$dx = \frac{du}{-2}$
$4x^2 = (1-u)^2$

Question 7

Carry out the following integrations **using the substitutions** given.

1. $\int x\sqrt{1-x}\,dx = \frac{2}{5}(1-x)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} + C$ Use $u = 1-x$, or $u = \sqrt{1-x}$

2. $\int \frac{6x}{\sqrt{2x+1}}\,dx = (2x+1)^{\frac{3}{2}} - 3(2x+1)^{\frac{1}{2}} + C$ Use $u = 2x+1$, or $u = \sqrt{2x+1}$

3. $\int \cos^3 x\,dx = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$ Use $u = \sin x$

4. $\int \sec^4 x\,dx = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$ Use $u = \tan x$

5. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(x-4)}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right| + C$ Use $u = \sqrt{x}$

6. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x}\,dx = \sqrt{x^2+9} + \frac{3}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+9}-3}{\sqrt{x^2+9}+3}\right| + C$ Use $u = \sqrt{x^2+9}$

7. $\int \frac{1+\cos x}{\sin x}\,dx = \ln|\cos x - 1| + C$ Use $u = \cos x$

8. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x-2}}\,dx = 2\sqrt{x-2} + 2\ln\left(1+\sqrt{x-2}\right) + C$ Use $u = \sqrt{x-2}$

9. $\int \sec^2 x \tan x\sqrt{1+\tan x}\,dx = \frac{2}{15}(3\tan x - 2)(1+\tan x)^{\frac{3}{2}} + C$ Use $u = \sqrt{1+\tan x}$

10. $\int \frac{9}{\sqrt{x}(9x-1)}\,dx = 3\ln\left|\frac{3\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}+1}\right| + C$ Use $u = \sqrt{x}$

1. $\int x\sqrt{1-x}\,dx = \int x\sqrt{u}\,(-du)$

$= \int (1-u)u^{\frac{1}{2}}(-du) = \int (u-1)u^{\frac{1}{2}}\,du = \int u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}}\,du$

$= \frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{5}(1-x)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} + C$

$u = 1-x$, $\frac{du}{dx} = -1$, $dx = -du$, $x = 1-u$

ALTERNATIVE

$\int x\sqrt{1-x}\,dx = \int x\,u\,(-2u\,du) = \int -2xu^2\,du$

$= \int -2(1-u^2)u^2\,du = \int -2u^2 + 2u^4\,du$

$= -\frac{2}{3}u^3 + \frac{2}{5}u^5 + C = \frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}(1-x)^{\frac{5}{2}} + C$

AS BEFORE

$u = \sqrt{1-x}$, $u^2 = 1-x$, $2u\frac{du}{dx} = -1$, $2u\,du = -dx$, $dx = -2u\,du$, $x = 1-u^2$

2. $\int \frac{6x}{\sqrt{2x+1}}\,dx = \int \frac{6x}{u^{\frac{1}{2}}}\,\frac{du}{2} = \int \frac{3u-3}{2u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$= \int \frac{3}{2}u^{\frac{1}{2}} - \frac{3}{2}u^{-\frac{1}{2}}\,du = u^{\frac{3}{2}} - 3u^{\frac{1}{2}} + C$

$= (2x+1)^{\frac{3}{2}} - 3(2x+1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = 2x+1$, $\frac{du}{dx} = 2$, $dx = \frac{du}{2}$, $2x = u-1$, $6x = 3u-3$

ALTERNATIVE

$\int \frac{6x}{\sqrt{2x+1}}\,dx = \int \frac{6x}{u}\,u\,du = \int 6x\,du$

$= \int 3u^2 - 3\,du = u^3 - 3u + C$

$= (2x+1)^{\frac{3}{2}} - 3(2x+1)^{\frac{1}{2}} + C$

$u = \sqrt{2x+1}$, $u^2 = 2x+1$, $2u\frac{du}{dx} = 2$, $du = u\,dx$, $2x = u^2-1$, $6x = 3u^2-3$

3. $\int \cos^3 x\,dx = \int \cos^2 x\,\frac{du}{\cos x} = \int \cos^2 x\,du$

$= \int 1 - \sin^2 x\,du = \int 1 - u^2\,du = u - \frac{1}{3}u^3 + C$

$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$

$u = \sin x$, $\frac{du}{dx} = \cos x$, $dx = \frac{du}{\cos x}$

4. $\int \sec^4 x\,dx = \int \sec^4 x\,\frac{du}{\sec^2 x} = \int \sec^2 x\,du$

$= \int 1 + \tan^2 x\,du = \int 1 + u^2\,du = u + \frac{1}{3}u^3 + C$

$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$

$u = \tan x$, $\frac{du}{dx} = \sec^2 x$, $dx = \frac{du}{\sec^2 x}$

5. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(x-4)}\,dx = \int \frac{1}{u(u^2-4)}\,2u\,du = \int \frac{2}{u^2-4}\,du$

BY PARTIAL FRACTIONS SINCE $= \int \frac{2}{(u-2)(u+2)}\,du$

$\frac{2}{(u-2)(u+2)} \equiv \frac{A}{u-2} + \frac{B}{u+2}$

$2 \equiv A(u+2) + B(u-2)$

if $u=2$ $4A = 2 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$

if $u=-2$ $-4B = 2 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$

$= \int \frac{1}{u-2} - \frac{1}{u+2}\,du$

$= \frac{1}{2}\ln|u-2| - \frac{1}{2}\ln|u+2| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-2}{u+2}\right|$

$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right| + C$

$u = \sqrt{x}$, $u^2 = x$, $2u\frac{du}{dx} = 1$, $dx = 2u\,du$

6. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x}\,dx = \int \frac{u}{x}\,\frac{u}{x}\,du = \int \frac{u^2}{x^2}\,du$

$\int \frac{u^2}{u^2-9}\,du = \int \frac{(u^2-9)+9}{(u^2-9)}\,du = \int 1 + \frac{9}{u^2-9}\,du$

$\int 1 + \frac{9}{(u+3)(u-3)}\,du = C$

PARTIAL FRACTIONS

$\frac{9}{(u+3)(u-3)} \equiv \frac{A}{u+3} + \frac{B}{u-3}$

$9 \equiv A(u-3) + B(u+3)$

if $x=3$ $9 = 6B \Rightarrow B = 3/2$

if $x=-3$ $9 = -6A \Rightarrow A = -3/2$

$= \int 1 + \frac{3/2}{u-3} - \frac{3/2}{u+3}\,du = u + \frac{3}{2}\ln|u-3| - \frac{3}{2}\ln|u+3| + C$

$= u + \frac{3}{2}\ln\left|\frac{u-3}{u+3}\right| + C = \sqrt{x^2+9} + \frac{3}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+9}-3}{\sqrt{x^2+9}+3}\right| + C$

$u = \sqrt{x^2+9}$, $u^2 = x^2+9$, $2u\frac{du}{dx} = 2x$, $\frac{u}{x}du = dx$, $x^2 = u^2-9$

7. $\int \frac{1+\cos x}{\sin x}\,dx = \int \frac{1+u}{\sin x}\,\frac{du}{-\sin x} = \int \frac{1+u}{\sin^2 x}\,du$

$= \int -\frac{1+u}{1-\cos^2 x}\,du = \int -\frac{1+u}{1-u^2}\,du$

$= \int -\frac{1+u}{(1-u)(1+u)}\,du = \int \frac{1}{u-1}\,du = \ln|u-1| + C$

$= \ln|\cos x - 1| + C$

$u = \cos x$, $\frac{du}{dx} = -\sin x$, $dx = \frac{du}{-\sin x}$

8. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x-2}}\,dx = \int \frac{1}{1+u} \times 2u\,du$

$= \int \frac{2u}{u+1}\,du = \int \frac{2(u+1)-2}{u+1}\,du = \int 2 - \frac{2}{u+1}\,du$

$= 2u + 2\ln|u+1| + C = 2\sqrt{x-2} + 2\ln|1+\sqrt{x-2}| + C$

$u = \sqrt{x-2}$, $u^2 = x-2$, $2u\frac{du}{dx} = 1$, $2u\,du = dx$

ALTERNATIVE

$\int \frac{1}{1+\sqrt{x-2}}\,dx = \int \frac{1}{u}\,2(u-1)\,du = \int \frac{2u-2}{u}\,du$

$= \int 2 - \frac{2}{u}\,du = 2u - 2\ln|u|$

$= 2(1+\sqrt{x-2}) - 2\ln|1+\sqrt{x-2}| + C$

$= 2 + 2\sqrt{x-2} - 2\ln|1+\sqrt{x-2}| + C$

AS BEFORE

$u = 1+\sqrt{x-2}$, $u-1 = \sqrt{x-2}$, $(u-1)^2 = x-2$, $x = 2+(u-1)^2$, $\frac{dx}{du} = 2(u-1)$, $dx = 2(u-1)\,du$

9. $\int \sec^2 x \tan x\sqrt{1+\tan x}\,dx$

$= \int \sec^2 x \tan x \times u\,\frac{2u}{\sec^2 x}\,du = \int 2u^2\tan x\,du$

$= \int 2u^2(u^2-1)\,du = \int 2u^4 - 2u^2\,du$

$= \frac{2}{5}u^5 - \frac{2}{3}u^3 + C = \frac{2}{5}(1+\tan x)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}(1+\tan x)^{\frac{3}{2}} + C$

OR $= \frac{2}{15}(1+\tan x)^{\frac{3}{2}}\left[3(1+\tan x) - 5\right] + C$

$= \frac{2}{15}(3\tan x - 2)(1+\tan x)^{\frac{3}{2}} + C$

$u = \sqrt{1+\tan x}$, $u^2 = 1+\tan x$, $2u\frac{du}{dx} = \sec^2 x$, $2u\,du = \sec^2 x\,dx$, $dx = \frac{2u}{\sec^2 x}\,du$, $\tan x = u^2-1$

10. $\int \frac{9}{\sqrt{x}(3x-1)}\,dx = \int \frac{9}{2x(9u^2-1)}\,2x\,du = \int \frac{18}{9u^2-1}\,du$

$= \int \frac{18}{(3u-1)(3u+1)}\,du$

BY PARTIAL FRACTIONS

$\frac{18}{(3u-1)(3u+1)} \equiv \frac{A}{3u-1} + \frac{B}{3u+1}$

$18 \equiv A(3u+1) + B(3u-1)$

- if $u = \frac{1}{3}$ $2A = 18 \Rightarrow A = 9$
- if $u = -\frac{1}{3}$ $-2B = 18 \Rightarrow B = -9$

$= \int \frac{9}{3u-1} - \frac{9}{3u+1}\,du = 3\ln|3u-1| - 3\ln|3u+1| = 3\ln\left|\frac{3u-1}{3u+1}\right| + C$

$= 3\ln\left|\frac{3\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}+1}\right| + C$

$u = \sqrt{x}$, $u^2 = x$, $2u\frac{du}{dx} = 1$, $2u\,du = dx$

Question 8

Carry out the following integrations.

1. $\int \frac{1}{2+\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x} - 4\ln\left|2+\sqrt{x}\right| + C$

2. $\int \frac{x^2}{1-2x}\,dx = -\frac{1}{4}x(x+1) - \frac{1}{8}\ln|1-2x| = -\frac{1}{16}(1-2x)^2 + \frac{1}{4}(1-2x) - \frac{1}{8}\ln|1-2x| + C$

3. $\int \frac{3x^2+2}{4x+1}\,dx = \frac{1}{64}\left(24x^2 - 12x + 35\ln|4x+1|\right) + C = \frac{3}{128}(4x+1)^2 - \frac{3}{32}(4x+1) + \frac{35}{64}\ln|4x+1|$

4. $\int \frac{4-3x}{2x+1}\,dx = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{4}\ln|2x+1| + C$

5. $\int \frac{x+1}{x-5}\,dx = x + 6\ln|x-5| + C$

6. $\int \frac{x^2}{x-2}\,dx = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 4\ln|x-2| + C$

7. $\int \frac{1}{2+\sqrt{x-1}}\,dx = 2\sqrt{x-1} - 4\ln\left|\sqrt{x-1}+2\right| + C$

8. $\int \frac{x+4}{x-4}\,dx = x + 8\ln|x-4| + C$

Question 9

Carry out the following integrations.

1. $\int x\sqrt{x+1}\,dx = \frac{2}{15}(3x+2)\sqrt{(x+1)^3} + C$

2. $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{x^2+2x+3}}\,dx = \frac{3}{4}\sqrt[3]{\left(x^2+2x+3\right)^2} + C$

3. $\int \frac{3x^3+5x}{x^2+1}\,dx = \frac{3}{2}x^2 + \ln\left|x^2+1\right| + C$

4. $\int \frac{2x+1}{3x-1}\,dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{9}\ln\left|3x-1\right| + C$

5. $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}\,dx = -\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + C$, use $x-1 = \frac{1}{u}$

6. $\int \frac{4x^3\sqrt{x^4+1}}{1+\sqrt{x^4+1}}\,dx = x^4 - 2\sqrt{x^4+1} + 2\ln\left|1+\sqrt{x^4+1}\right| + C$

Question 10

Carry out the following integrations to the answers given.

1. $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{(2-x)^2}\, dx = \frac{1}{3} + \ln\left(\frac{3}{4}\right)$

2. $\displaystyle\int_1^{2} \frac{x}{(2x-1)^2}\, dx = \frac{2+\ln 27}{12}$

3. $\displaystyle\int_0^{2} \frac{x+2}{\sqrt{4x+1}}\, dx = \frac{17}{6}$

4. $\displaystyle\int_0^{36} \frac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}\, dx = \ln 16$

5. $\displaystyle\int_{-6}^{\frac{3}{2}} \frac{x}{\sqrt{4-2x}}\, dx = -\frac{9}{2}$

6. $\displaystyle\int_1^{5} \frac{x+1}{(2x-1)^{\frac{3}{2}}}\, dx = 2$

7. $\displaystyle\int_{\frac{2}{3}}^{1} \frac{x}{2x-1}\, dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{4}\ln 3$

8. $\displaystyle\int_{-1}^{7} \frac{x^2}{\sqrt{x+2}}\, dx = \frac{652}{15}$

9. $\displaystyle\int_1^{\frac{5}{2}} \frac{4x}{\sqrt{2x-1}}\, dx = \frac{20}{3}$

10. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x}{(1+x)^2}\, dx = -\frac{1}{2} + \ln 2$

1. $\int_{-2}^{\frac{3}{2}} \frac{x}{(2-x)^2}\,dx = \int_{2}^{\frac{3}{2}} \frac{x}{u^2}(-du) = \int_{2}^{\frac{3}{2}} \frac{2-u}{u^2}(-du)$

$= \int_{2}^{\frac{3}{2}} \frac{u-2}{u^2}\,du = \int_{2}^{\frac{3}{2}} \frac{u}{u^2} - \frac{2}{u^2}\,du = \int_{2}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{u} - 2u^{-2}\,du$

$= \left[\ln|u| + 2u^{-1}\right]_{2}^{\frac{3}{2}} = \left[\ln|u| + \frac{2}{u}\right]_{2}^{\frac{3}{2}}$

$= \left(\ln\frac{3}{2} + \frac{2}{\frac{3}{2}}\right) - \left(\ln 2 + 1\right) = \ln\frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \ln 2 - 1 = \ln\left(\frac{3/2}{2}\right) + \frac{1}{3}$

$= \frac{1}{3} + \ln\left(\frac{3}{4}\right)$

$u = 2-x$
$\frac{du}{dx} = -1$
$du = -dx$
$x=0 \mapsto u=2$
$x=\frac{3}{2} \mapsto u=\frac{1}{2}$
$x = 2-u$

2. $\int_{1}^{2} \frac{x}{(2x-1)^2}\,dx = \int_{1}^{3} \frac{x}{u^2}\frac{du}{2} = \int_{1}^{3} \frac{\frac{u+1}{2}}{u^2}\frac{du}{2}$

$\frac{1}{2}\int_{1}^{3} \frac{\frac{u+1}{2}}{u^2}\,du = \frac{1}{2}\int_{1}^{3} \frac{u+1}{2u^2}\,du = \frac{1}{4}\int_{1}^{3} \frac{u+1}{u^2}\,du$

$\frac{1}{4}\int_{1}^{3} \frac{u}{u^2} + \frac{1}{u^2}\,du = \frac{1}{4}\int_{1}^{3} \frac{1}{u} + u^{-2}\,du = \frac{1}{4}\left[\ln|u| - u^{-1}\right]_{1}^{3}$

$= \frac{1}{4}\left[\ln|u| - \frac{1}{u}\right]_{1}^{3} = \frac{1}{4}\left[\left(\ln 3 - \frac{1}{3}\right) - \left(\cancel{\ln 1} - 1\right)\right]$

$= \frac{1}{4}\left[\ln 3 - \frac{1}{3} + 1\right] = \frac{1}{4}\left[\ln 3 + \frac{2}{3}\right] = \frac{1}{4}\ln 3 + \frac{1}{6}$

$= \frac{3}{12}\ln 3 + \frac{2}{12} = \frac{3\ln 3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3\ln 3 + 2}{12} = \frac{\ln 27 + 2}{12}$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=1 \mapsto u=1$
$x=2 \mapsto u=3$
$2x = u+1$
$x = \frac{u+1}{2}$

3. $\int_{0}^{2} \frac{x+2}{\sqrt{4x+1}}\,dx = \int_{1}^{9} \frac{\frac{u-1}{4}+2}{u^{\frac{1}{2}}}\frac{du}{4} = \frac{1}{4}\int \frac{\frac{u-1}{4}+2}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

MULTIPLY TOP & BOTTOM OF THE FRACTION BY 4

$= \frac{1}{4}\int_{1}^{9} \frac{u-1+8}{4u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{16}\int_{1}^{9} \frac{u+7}{u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{16}\int_{1}^{9} u^{\frac{1}{2}} + 7u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$= \frac{1}{16}\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + 14u^{\frac{1}{2}}\right]_{1}^{9} = \frac{1}{16}\left[\left(\frac{2}{3}\times 27 + 14\times 3\right) - \left(\frac{2}{3} + 14\right)\right]$

$= \frac{1}{16}\left[18 + 42 - \frac{2}{3} - 14\right] = \frac{1}{16}\times\frac{136}{3} = \frac{17}{6}$

$u = 4x+1$
$\frac{du}{dx} = 4$
$dx = \frac{du}{4}$
$x=0 \mapsto u=1$
$x=2 \mapsto u=9$
$4x = u-1$
$x = \frac{u-1}{4}$

4. $\int_{0}^{36} \frac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}\,dx = \int_{0}^{6} \frac{1}{\cancel{u}(u+2)}\,2\cancel{u}\,du$

$= \int_{0}^{6} \frac{2}{u+2}\,du = \left[2\ln|u+2|\right]_{0}^{6}$

$= 2\ln 8 - 2\ln 2 = \ln 64 - \ln 4 = \ln\left(\frac{64}{4}\right) = \ln 16$

$u = \sqrt{x}$
$u^2 = x$
$2u\frac{du}{dx} = 1$
$2u\,du = dx$
$x=0 \mapsto u=0$
$x=36 \mapsto u=6$

5. $\int_{-6}^{\frac{3}{2}} \frac{x}{\sqrt{4-2x}}\,dx = \int_{4}^{1} \frac{x}{\cancel{u}}(-\cancel{u}\,du)$

$= \int_{1}^{4} x\,du = \int_{1}^{4} 2 - \frac{1}{2}u^2\,du = \left[2u - \frac{1}{6}u^3\right]_{1}^{4}$

$= \left[8 - \frac{32}{3}\right] - \left[2 - \frac{1}{6}\right] = 8 - \frac{32}{3} - 2 + \frac{1}{6} = -\frac{9}{2}$

$u = \sqrt{4-2x}$
$u^2 = 4-2x$
$2u\frac{du}{dx} = -2$
$2u\,du = -2dx$
$dx = -u\,du$
$x=-6 \mapsto u=4$
$x=\frac{3}{2} \mapsto u=1$
$2x = 4-u^2$
$x = 2-\frac{1}{2}u^2$

6. $\int_{1}^{5} \frac{x+1}{(2x-1)^{\frac{1}{2}}}\,dx = \int_{1}^{9} \frac{\frac{u+1}{2}+1}{u^{\frac{1}{2}}}\frac{du}{2}$

$= \frac{1}{2}\int_{1}^{9} \frac{\frac{u+1}{2}+1}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$ MULTIPLY TOP & BOTTOM OF THE FRACTION BY 2

$= \frac{1}{2}\int_{1}^{9} \frac{u+1+2}{2u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{4}\int_{1}^{9} \frac{u+3}{u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$= \frac{1}{4}\int_{1}^{9} \frac{u}{u^{\frac{1}{2}}} + \frac{3}{u^{\frac{1}{2}}}\,du = \frac{1}{4}\int_{1}^{9} u^{-\frac{1}{2}} + 3u^{-\frac{1}{2}}\,du$

$= \frac{1}{4}\left[2u^{\frac{1}{2}} - 6u^{-\frac{1}{2}}\right]_{1}^{9} = \frac{1}{4}\left[\left(2\times 3 - 6\times\frac{1}{3}\right) - \left(2-6\right)\right]$

$= \frac{1}{4}\left[6 - 2 - 2 + 6\right] = \frac{1}{4}\times 8 = 2$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=1 \mapsto u=1$
$x=5 \mapsto u=9$
$u+1 = 2x$
$x = \frac{u+1}{2}$

7. $\int_{\frac{1}{3}}^{1} \frac{x}{2x-1}\,dx = \int_{\frac{1}{3}}^{1} \frac{\frac{u+1}{2}}{u}\frac{du}{2} = \frac{1}{4}\int_{\frac{1}{3}}^{1} \left(\frac{u+1}{u}\right)du$

$= \frac{1}{4}\int_{\frac{1}{3}}^{1} \frac{u+1}{u}\,du = \frac{1}{4}\int_{\frac{1}{3}}^{1} 1 + \frac{1}{u}\,du$

$= \frac{1}{4}\left[u + \ln|u|\right]_{\frac{1}{3}}^{1} = \frac{1}{4}\left(\left(1+\ln 1\right) - \left(\frac{1}{3} + \ln\frac{1}{3}\right)\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3} - \ln\frac{1}{3}\right)$

$= \frac{1}{6} - \frac{1}{4}\ln\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4}\ln 3$

$u = 2x-1$
$\frac{du}{dx} = 2$
$dx = \frac{du}{2}$
$x=\frac{1}{3} \mapsto u=\frac{1}{3}$
$x=1 \mapsto u=1$
$2x = u+1$
$x = \frac{u+1}{2}$

8. $\int_{-1}^{7} \frac{x^2}{\sqrt{2x+2}}\,dx = \int_{1}^{3} \frac{x^2}{\cancel{u}}\,2\cancel{u}\,du = \int_{1}^{3} 2\left(u^2-2\right)^2 du$

$= \int_{1}^{3} 2\left(u^4 - 4u^2 + 4\right)du = \int_{1}^{3} 2u^4 - 8u^2 + 8\,du$

$= \left[\frac{2}{5}u^5 - \frac{8}{3}u^3 + 8u\right]_{1}^{3} = \left(\frac{486}{5} - \frac{216}{3} + 24\right) - \left(\frac{2}{5} - \frac{8}{3} + 8\right)$

$= \frac{486}{5} - 216 + 24 - \frac{2}{5} + \frac{8}{3} - 8 = \frac{552}{15}$

$u = \sqrt{2x+2}$
$u^2 = 2x+2$
$2u\frac{du}{dx} = 1$
$dx = 2u\,du$
$x=-1 \mapsto u=1$
$x=7 \mapsto u=3$
$x = u^2-2$

9. $\int_{1}^{\frac{5}{2}} \frac{4x}{\sqrt{2x-1}}\,dx = \int_{1}^{2} \frac{4x}{\cancel{u}}\,u\,du = \int_{1}^{2} 2u^2 + 2\,du$

$= \left[\frac{2}{3}u^3 + 2u\right]_{1}^{2} = \left(\frac{16}{3} + 4\right) - \left(\frac{2}{3} + 2\right) = \frac{18}{3} + 4 - \frac{2}{3} - 2$

$= \frac{20}{3}$

$u = \sqrt{2x-1}$
$u^2 = 2x-1$
$2u\frac{du}{dx} = 2$
$dx = u\,du$
$x=1 \mapsto u=1$
$x=\frac{5}{2} \mapsto u=2$
$2x = u^2+1$

10. $\int_{0}^{1} \frac{x}{(1+x)^2}\,dx = \int_{1}^{2} \frac{x}{u^2}\,du = \int_{1}^{2} \frac{u-1}{u^2}\,du$

$= \int_{1}^{2} \frac{u}{u^2} - \frac{1}{u^2}\,du = \int_{1}^{2} \frac{1}{u} - u^{-2}\,du = \left[\ln|u| + u^{-1}\right]_{1}^{2}$

$= \left[\ln|u| + \frac{1}{u}\right]_{1}^{2} = \left(\ln 2 + \frac{1}{2}\right) - \left(\cancel{\ln 1} + 1\right)$

$= \ln 2 + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} + \ln 2$

$u = x+1$
$\frac{du}{dx} = 1$
$du = dx$
$x=0 \mapsto u=1$
$x=1 \mapsto u=2$
$x = u-1$

Question 11

Carry out the following integrations to the answers given.

1. $\int_0^3 x\sqrt{x+1}\ dx = \frac{116}{15}$

2. $\int_0^2 \frac{6x^3}{\sqrt{x^2+1}}\ dx = 4\left(1+\sqrt{5}\right)$

3. $\int_{-1}^0 \frac{x^2}{1-x}\ dx = -\frac{1}{2}+\ln 2$

4. $\int_0^{100} \frac{1}{20-\sqrt{x}}\ dx = 40\ln 2 - 20$

5. $\int_0^{\frac{1}{4}} 2x\sqrt{1-4x}\ dx = \frac{1}{30}$

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos x\left(1+\sin x\right)^5\ dx = \frac{107}{14}$

7. $\int_2^5 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}\ dx = \frac{356}{15}$

Question 12

Carry out the following integrations to the answers given.

1. $\displaystyle\int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\, dx = \frac{\pi}{2} - 1$, use $x = 2\sin\theta$



2. $\displaystyle\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\, dx = \frac{1}{4}\left(\sqrt{3}-1\right)$, use $x = 2\cos\theta$



3. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{\left(1+x^2\right)^2}\, dx = \frac{1}{8}\left(\pi+2\right)$, use $x = \tan\theta$



4. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}\, dx = \frac{1}{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$, use $x = \sec\theta$



5. $\displaystyle\int_{0}^{\frac{3}{4}} \frac{1}{\sqrt{3-4x^2}}\, dx = \frac{\pi}{6}$, use $x = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta$



6. $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{1}{\left(1+3x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\, dx = \frac{1}{2}$, use $x = \frac{1}{\sqrt{3}}\tan\theta$



7. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}\ dx = \frac{\pi}{4}$, use $x = \sqrt{2}\sin\theta$



8. $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4x^2+3}\ dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{36}$, use $x = \frac{\sqrt{3}}{2}\tan\theta$



9. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\left(4-x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\ dx = \frac{\sqrt{3}}{12}$, use $x = 2\sin\theta$



10. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\, dx = \sqrt{3}-1-\frac{\pi}{12}$, use $x = \operatorname{cosec}\theta$



$$\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\, dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{\operatorname{cosec}^2\theta - 1}}{\operatorname{cosec}\theta}\left(-\operatorname{cosec}\theta\cot\theta\right) d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cot^2\theta}\,\left(\cot\theta\right) d\theta = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cot^2\theta\, d\theta = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{cosec}^2\theta - 1\, d\theta$$

$$= \Big[-\cot\theta - \theta\Big]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \Big[\cot\theta + \theta\Big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} = \left(\cot\tfrac{\pi}{6} + \tfrac{\pi}{6}\right) - \left(\cot\tfrac{\pi}{4} + \tfrac{\pi}{4}\right)$$

$$= \sqrt{3} + \frac{\pi}{6} - 1 - \frac{\pi}{4} = \sqrt{3} - 1 - \frac{\pi}{12}$$

$x = \operatorname{cosec}\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = -\operatorname{cosec}\theta\cot\theta$

$dx = -\operatorname{cosec}\theta\cot\theta\, d\theta$

$x = 2$ $\quad 2 = \operatorname{cosec}\theta$

$\frac{1}{2} = \sin\theta$

$\theta = \frac{\pi}{6}$

$x = \sqrt{2}$ $\quad \sqrt{2} = \operatorname{cosec}\theta$

$\frac{1}{\sqrt{2}} = \sin\theta$

$\theta = \frac{\pi}{4}$

11. $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{4-3x^2}}\, dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{9}$, use $x = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta$



$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-3x^2}}\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{4-3\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta\right)^2}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{4-3\left(\frac{4}{3}\sin^2\theta\right)}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{4-4\sin^2\theta}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{4(1-\sin^2\theta)}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{4\cos^2\theta}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cancel{2\cos\theta}} \times \frac{\cancel{2}}{\sqrt{3}}\cancel{\cos\theta}\, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sqrt{3}}\, d\theta$$

$$= \left[\frac{1}{\sqrt{3}}\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - 0 = \frac{\sqrt{3}}{9}\pi$$

$x = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta$

$dx = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\, d\theta$

$x = 0$, $\sin\theta = 0$

$\theta = 0$

$x = 1$ $\quad \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$

12. $\displaystyle\int_{1}^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{x^2+1}\, dx = \sqrt{3}-1-\frac{\pi}{12}$, use $x = \tan\theta$



$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{x^2+1}\, dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}\left(\sec^2\theta\, d\theta\right)$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2\theta}{\sec^2\theta} \times \sec^2\theta\, d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^2\theta\, d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \sec^2\theta - 1\, d\theta = \Big[\tan\theta - \theta\Big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \left(\tan\tfrac{\pi}{3} - \tfrac{\pi}{3}\right) - \left(\tan\tfrac{\pi}{4} - \tfrac{\pi}{4}\right)$$

$$= \left(\sqrt{3} - \tfrac{\pi}{3}\right) - \left(1 - \tfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} - 1 - \frac{\pi}{12}$$

$x = \tan\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = \sec^2\theta$

$dx = \sec^2\theta\, d\theta$

$x = \sqrt{3}$ $\quad \tan\theta = \sqrt{3}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$

$x = 1$ $\quad \tan\theta = 1$

$\theta = \frac{\pi}{4}$

13. $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{16-x^2}\ \ dx = \frac{1}{3}\left(4\pi + 6\sqrt{3}\right)$, use $x = 4\sin\theta$

$$\int_0^2 \sqrt{16-x^2}\ dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{16-(4\sin\theta)^2} \times 4\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{16-16\sin^2\theta} \times 4\cos\theta\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{16(1-\sin^2\theta)}\ 4\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{16\cos^2\theta}\ 4\cos\theta\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 4\cos\theta \times 4\cos\theta\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 16\cos^2\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} 16\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos 2\theta\right) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 8 + 8\cos 2\theta\ d\theta$$

$$= \left[8\theta + 4\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \left(\tfrac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}\right) - (0)$$

$$= \tfrac{1}{3}\left(4\pi + 6\sqrt{3}\right)$$

$x = 4\sin\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = 4\cos\theta$

$dx = 4\cos\theta\, d\theta$

- $x = 0$, $\sin\theta = 0$, $\theta = 0$
- $x = 2$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{6}$

14. $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{\left(3x^2+4\right)^{\frac{3}{2}}}\ dx = \frac{1}{8}$, use $x = \frac{2}{\sqrt{3}}\tan\theta$

$$\int_0^2 \frac{1}{(3x^2+4)^{\frac{3}{2}}}\ dx = \ldots \text{ by substitution}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\left[3\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\tan\theta\right)^2 + 4\right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\left[3\times\frac{4}{3}\tan^2\theta + 4\right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\left[4(\tan^2\theta+1)\right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{(4\sec^2\theta)^{\frac{3}{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{8\sec^2\theta}\ \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{2\sec^2\theta}{8\sqrt{3}\sec^2\theta}\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4\sqrt{3}}\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta = \frac{1}{4\sqrt{3}}\left[\sin\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{4\sqrt{3}}\left[\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right] = \frac{1}{8}$$

$x = \frac{2}{\sqrt{3}}\tan\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta$

$dx = \frac{2}{\sqrt{3}}\sec^2\theta\ d\theta$

- $x = 0$, $0 = \frac{2}{\sqrt{3}}\tan\theta$, $\tan\theta = 0$, $\theta = 0$
- $x = 2$, $2 = \frac{2}{\sqrt{3}}\tan\theta$, $\tan\theta = \sqrt{3}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$

15. $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{16-3x^2}\ \ dx = \frac{8\pi\sqrt{3}}{9} + 2$, use $x = \frac{4}{\sqrt{3}}\sin\theta$

$$\int_0^2 \sqrt{16-3x^2}\ dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{16 - 3\left(\tfrac{16}{3}\sin^2\theta\right)}\ \tfrac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{16 - 16\sin^2\theta}\ \tfrac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{16(1-\sin^2\theta)}\ \tfrac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{16\cos^2\theta} \times \tfrac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tfrac{16}{\sqrt{3}}\cos^2\theta\ d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tfrac{16}{\sqrt{3}}\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos 2\theta\right) d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tfrac{8}{\sqrt{3}} + \tfrac{8}{\sqrt{3}}\cos 2\theta\ d\theta = \left[\tfrac{8}{\sqrt{3}}\theta + \tfrac{4}{\sqrt{3}}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \left(\tfrac{8}{\sqrt{3}} \times \tfrac{\pi}{3} + \tfrac{4}{\sqrt{3}} \times \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) - 0 = \tfrac{8\pi\sqrt{3}}{9} + 2$$

$x = \frac{4}{\sqrt{3}}\sin\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = \frac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta$

$dx = \frac{4}{\sqrt{3}}\cos\theta\ d\theta$

$x = 0 \longmapsto \theta = 0$

$x = 2 \longmapsto \theta = \frac{\pi}{3}$

$2 = \frac{4}{\sqrt{3}}\sin\theta$

$\frac{2\sqrt{3}}{4} = \sin\theta$

$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

16. $\displaystyle\int_0^3 \frac{27}{\left(9+x^2\right)^2}\, dx = \frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$, use $x = 3\tan\theta$

$$\int_0^3 \frac{27}{(9+x^2)^2}\,dx = \dots = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{27}{(9+9\tan^2\theta)^2}\left(3\sec^2\theta\, d\theta\right)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{81\sec^2\theta}{\left(9(1+\tan^2\theta)\right)^2}\, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{81\sec^2\theta}{81(\sec^2\theta)^2}\, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2\theta}{\sec^4\theta}\, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2\theta\, d\theta = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\theta)\, d\theta$$

$$= \left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}\right) - \cancel{(0+0)}$$

$$= \frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$$

$x = 3\tan\theta$

$\frac{dx}{d\theta} = 3\sec^2\theta$

$dx = 3\sec^2\theta\, d\theta$

$x=0,\ \theta=0$

$x=3,\ \theta=\frac{\pi}{4}$